

بحر اعظموں اور براعظموں کی تقسیم

دلیل ”برا عظمی سرکاؤ نظریہ“ کی شکل میں پیش کی۔ یہ بحر اعظموں اور براعظموں کی تقسیم سے متعلق تھی۔

الفریڈ ویگنر (Alfred Wegener) کے مطابق موجودہ سبھی براعظم ابتداء میں ایک براعظمی تودہ کی شکل میں تھے اور ایک انتہائی بڑے بحر اعظم نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس نے اس سپر (Super) براعظم کا نام ”پنجیا“ (Pangaea) رکھا جس کے معنی ہیں تمام زمین۔ اس انتہائی بڑے بحر اعظم کا نام ”پنٹھالسا“ (Panthalassa) تھا جس کے معنی ہیں تمام پانی۔ اس نے یہ دلیل دی کہ تقریباً 200 ملین سال قبل سپر براعظم ”پنجیا“ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ پنجیا پہلے دو بڑے براعظمی تودوں میں منقسم ہوا۔ لوریشا (Laurasia) اور گونڈوانا لینڈ (Gondwana land) جو بالترتیب شمالی اور جنوبی حصے بن گئے۔ بعد میں یوریشیا اور گونڈوانا لینڈ کئی چھوٹے براعظموں میں ٹوٹتے چلے گئے جو آج موجود ہیں۔ براعظمی سرکاؤ کی تائید میں کئی ثبوت پیش کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ذیل میں دیئے گئے ہیں۔

براعظمی سرکاؤ کی تائید میں ثبوت (Evidence in

Support of the Continental Drift)

براعظموں کا تطابق (جگ۔ سا۔ فٹ) (Jig-Saw-Fit)

[The Matching of Continents (jig-Saw-fit)]

ایک دوسرے کے آمنے سامنے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ساحلی خطوط میں قابل دید یکسانیت پائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ کمپیوٹر

گذشتہ باب میں آپ نے اندرون زمین کا مطالعہ کیا۔ آپ عالمی نقشہ سے بھی واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ براعظم سطح زمین کے 29 فیصد حصے پر ہیں اور باقی بحری پانی کے تحت ہے۔ براعظموں اور بحر اعظموں کی پوزیشن جیسا کہ آج ہم نقشے پر دیکھتے ہیں ماضی میں ایسی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بحر اعظموں اور براعظموں کی موجودہ حالت آنے والے وقت میں نہیں رہے گی۔ اگر ایسا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ان کی پوزیشن کیا تھی۔ وہ اپنی پوزیشن کیوں اور کیسے بدلتے ہیں؟ اور اگر یہ صحیح ہے کہ براعظموں اور بحر اعظموں نے اپنی پوزیشن بدلی ہے اور اب بھی بدل رہے ہیں تو اس کا پتہ سائنس دانوں کو کیسے لگا؟ انہوں نے ان کی ماقبل پوزیشن کو کیسے طے کیا؟ ان میں سے کچھ مزید متعلقہ سوالوں کے جواب آپ اس باب میں پائیں گے۔

براعظمی سرکاؤ (Continental Drift)

بحر اوقیانوس کے ساحل کا مطالعہ کیجئے۔ اس بحر اعظم کے دونوں اطراف پر ساحلی خطوط کی یکسانیت کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کئی سائنس دانوں نے اس یکسانیت کے بارے میں سوچا اور دونوں امریکہ، یورپ اور افریقہ کے کبھی ایک ساتھ ملنے کے امکان پر غور کیا۔ سائنس کے معلوم تاریخی ریکارڈ سے ایک ڈچ نقشہ نویس (ابراہم آریلیس) نے پہلی بار اس امکان کی تجویز 1596 میں پیش کی۔ انٹونیو پلیگرینی نے ایک نقشہ بنایا جس میں تینوں براعظموں کو ایک ساتھ دکھایا۔ 1912 میں ایک جرمن ماہر موسمیات الفریڈ ویگنر نے ایک جامع

چٹانوں کی مطلقاً عدم موجودگی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ سونے کی موجودگی والی پرتیں (Gold bearing veins) برازیل میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ واضح ہے کہ گھانا میں سونے کے ذخیرے برازیل کے پٹھار سے ماخذ ہیں جب دونوں براعظم ساتھ ساتھ تھے۔

رکازوں کی تقسیم (Distribution of Fossils)

پودوں اور جانوروں کی ایک جیسی قسمیں جب زمین یا بیٹھے پانی میں رہنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ سمندری رکاوٹوں کے دونوں طرف پائی جاتی ہیں۔ ایسی تقسیم کی توجیہ کرنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستان، مڈگاسکر اور افریقہ میں لیمور کے ہونے کے مشاہدہ نے کچھ لوگوں کو ان تینوں زمینی تودوں کو ملا کر ایک مسلسل زمینی تودہ ”لیموریا“ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میسوسورس (Mesosaurus) ایک چھوٹا رنگینے والا جاندار ہے جو اٹھلے کھارے پانی میں رہنے کا عادی ہے۔ اس کی ہڈیاں صرف دو مقامات میں پائی گئی ہیں۔ یہ دونوں مقامات اس وقت درمیان میں سمندر کی وجہ سے 4 ہزار کلومیٹر دور ہیں۔

سرکاؤ کے لئے قوت (Force for Drifting)

ویکینر کے مطابق براعظموں کی سرکاوی حرکت دو وجوہات سے ہوئی (۱) قطبی فراری قوت اور (۲) مدوجزری قوت۔ قطبی فراری قوت زمین کی گردش سے متعلق ہے۔ آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ زمین ایک مکمل کرہ نہیں ہے۔ اس میں خطہ استوا پر ابھار ہے۔ اور یہ ابھار زمین کی گردش کی وجہ سے ہے۔ ویکینر کے ذریعہ بتائی گئی دوسری قوت یعنی مدوجزری قوت چاند اور سورج کی کشش کی وجہ سے ہے جس کی بناء پر سمندر کے پانی میں مدوجزری پیدا ہوتے ہیں۔ ویکینر کا ماننا تھا کہ اگر یہ قوتیں کروڑوں سال تک کام کرتی رہیں تو ان کے موثر ہونے کے امکانات ہیں۔ بہر کیف زیادہ تر عالموں نے ان قوتوں کو قطعاً کافی مانا ہے۔

سرکاؤ کے بعد کے مطالعے (Post Drift Studies)

یہ بات دلچسپ ہے کہ براعظمی سرکاؤ کے لئے زیادہ تر ثبوت نباتات یا

پروگرام کا استعمال کر کے بحر اٹلانٹک کے کناروں کی بہترین مناسبت (Best Fit) کا پتہ لگانے کے لئے 1964 میں بلا رڈ نے ایک نقشہ تیار کیا۔ اسی میں دونوں ساحلوں کی جوڑی داری کو موجودہ ساحلی خطہ کے بجائے 1000 فیدم لائن پر ملانے کی کوشش کی گئی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔

بحر اعظموں کے دونوں اطراف میں موجود ایک

ہی عمر کی چٹانیں

(Rocks of Same Age Across the Oceans)


حال ہی میں ریڈیومیٹری سے تاریخ نکالنے کے طریقے کی ترویج نے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وسیع بحر اعظموں کے دونوں اطراف میں موجود مختلف براعظموں کی چٹانی ساخت میں آپسی تعلق قائم کیا جاسکے۔ برازیل کے ساحل کی 2 ہزار ملین سال قدیم چٹانوں کی پٹی مغربی افریقہ کی چٹانوں سے مطابقت رکھتی ہے جنوبی امریکہ اور افریقہ کے ساحل کے ساتھ موجود اولین سمندری ذخیرے جوراسک (Jurassic) عہد کے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے پہلے وہاں بحر اعظم کا وجود نہیں تھا۔

ٹلائٹ (Tillite)

یہ گلیشیر کی ذخیرہ اندوزی سے بنی رسوبی چٹان ہے۔ ہندوستان سے گونڈوانا سٹم کے رسوب کے جوابی حصے جنوبی نصف کرہ کے چھ مختلف زمینی تودوں میں ملتے ہیں۔ اس سٹم کے بنیادی حصے میں ٹلائٹ کی موٹی پرت وسیع اور لمبے عرصے کے گلیشائی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس ترتیب کے جوابی حصے ہندوستان کے علاوہ افریقہ، جزیرہ فاک لینڈ، مڈگاسکر، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ گونڈوانا سٹم کے رسوب کی مجموعی مشابہت صاف طور پر واضح کرتی ہے کہ ان زمینی تودوں کی تاریخ نمایاں طور پر ایک جیسی ہے۔ گلیشائی ٹلائٹ قدیمی آب و ہوا اور براعظموں کے سرکاؤ کا بھی غیر مبہم ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

پلیسر ذخیرہ (Placer Deposits)

گھانا ساحل میں سونے کے پلیسر ذخیروں کا ہونا اور اس خطے میں ماخذی



تصویر 4.1 : بحری فرش

بحری فرش کی شکل و صورت

(Ocean Floor Configuration)

اس حصے میں ہم کچھ چیزوں کو نوٹ کریں گے جو بحری فرش کی شکل و صورت سے متعلق ہیں اور ہمیں براعظموں اور بحراظموں کی تقسیم کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ آپ تیرہویں باب میں بحری فرش کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ سمندر کی گہرائی اور ریلیف کی شکلوں کی بنیاد پر بحری فرش کو تین اہم حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ حصے ہیں: براعظمی حاشیے، گہرے سمندری طاس اور وسط بحری ستیغ۔

براعظمی حاشیے (Continental Margins)

یہ براعظمی کناروں اور گہری سمندری طاس کے درمیان عبوری حصہ بناتے ہیں۔ ان میں براعظمی شیلف، براعظمی ڈھال، براعظمی ابھار اور گہری بحری کھائیاں شامل ہیں۔ ان میں سے گہری بحری کھائیاں بحراظموں اور براعظموں کی تقسیم کے سلسلے میں قابل لحاظ دلچسپی والے علاقے ہیں۔

پاتالی میدان (Abyssal Plains)

یہ وسیع میدان ہیں جو براعظمی حاشیے اور وسط بحری ستیغوں کے درمیان واقع ہیں۔ پاتالی میدان وہ علاقے ہیں جہاں براعظمی رسوب کناروں کو پار کر کے ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں۔

حیوانات کی تقسیم کی شکل میں یا ٹلائٹ جیسے ذخیروں کی شکل میں براعظمی علاقوں سے اکٹھا کئے گئے تھے۔ جنگ کے بعد کے زمانے میں کئی دریافتوں سے ارضیاتی ادب میں اضافہ ہوا۔ خاص کر سمندری فرش کی نقشہ کشی سے اکٹھا کی گئی معلومات نے براعظموں اور بحراظموں کی تقسیم کے مطالعے کے لئے نئی جہت فراہم کی۔

حمالی دھارائیں کا نظریہ

(Convictional Current Theory)

آرتھر ہومز نے 1930 کے عشرہ میں مینٹل کے حصہ میں فعال حمالی دھاراؤں کے امکانات پر بحث کی۔ یہ دھارا میں مینٹل کے حصے میں تاب کار عناصر کی وجہ سے پیدا شدہ حرارتی فرق کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہومز نے کہا کہ ایسے دھاراؤں کا نظام پورے مینٹل کے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ قوت کے مدے پر ایک تشریح فراہم کرنے کی کوشش تھی جس کی بنیاد پر ہم عصر سائنس دانوں نے براعظمی سرکاؤ کے نظریے کو برخواست کر دیا۔

بحراعظمی فرش کی نقشہ کشی

(Mapping of the Ocean Floor)

بحراعظم کی شکل و صورت کی تفصیلی تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ بحری فرش صرف ایک وسیع میدان نہیں ہے بلکہ یہ ریلیف سے بھرا ہوا ہے۔ جنگ کے بعد کے زمانے میں بحری فرش کی نقشہ نویسی کی مہمات نے بحری ریلیف کی تفصیل پیش کی اور پانی میں ڈوبے پہاڑی سلسلوں اور گہری خندقوں کے وجود کا پتہ دیا جو زیادہ تر براعظمی کناروں کے پاس ہی واقع ہیں۔ وسط بحری ستیغ آتش فشاں کے پھٹنے کے معاملے میں سب سے زیادہ فعال پائے گئے تھے۔ بحری قشر کی چٹانوں کی تاریخ نے اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ یہ چٹانیں براعظمی علاقوں کی بہ نسبت زیادہ نوخیز ہیں۔ بحری ستیغ کے چوٹی کے دونوں طرف کی چٹانیں اور چوٹی سے برابر دوری پر واقع ہونے سے ان کی بناوٹ اور عمر میں قابل ذکر یکسانیت کا پتہ چلا ہے۔

جاتی ہے اور برصغیر ہند کے جنوب میں دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک شاخ مشرقی افریقہ کی طرف جاتی ہے اور دوسری میانمار سے بنگالی تک اسی طرح کی لکیر سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نقطوں کی یہ لکیر وسط بحری ستیج سے ملتی ہے۔ سایہ دار پٹی ارتکاز کے دوسرے علاقے کو دکھاتی ہے جو الپائن، ہمالیائی نظام اور بحرالکاہل کے حلقے سے ملتی ہے۔ عام طور پر زلزلے کے ماسکے وسط بحری سلسلوں کے علاقے میں کم گہرائی پر ہوتے ہیں جبکہ الپائن، ہمالیائی پٹی اور بحرالکاہل کے حلقے کے ساتھ زلزلے کافی گہرائی میں آتے ہیں۔ آتش فشاں کا نقشہ بھی اسی طرح کی ترتیب کو دکھاتا ہے۔ بحرالکاہل کے کناروں کو حلقہ آتش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں فعال آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔

وسط - بحری ستیج (Mid-Oceanic Ridges)

یہ بحر اعظموں میں پہاڑی نظام کا ایک بین ربطی سلسلہ بناتا ہے۔ یہ سطح زمین پر سب سے طویل پہاڑی سلسلہ ہے حالانکہ یہ بحری پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی خصوصیات میں چوٹی پر مرکزی شکاف کا نظام، اس کی لمبائی میں شکستہ پٹھار اور بغلی منطقے شامل ہیں۔ چوٹی پر شکافی نظام شدید آتش فشانی سرگرمیوں کا خطہ ہے۔ گذشتہ باب میں آپ کو اس قسم کے آتش فشاں اور وسط بحری آتش فشاں سے تعارف کرایا جا چکا ہے۔


زلزلے اور آتش فشاں کی تقسیم (Distribution of Earthquakes and Volcanoes)

تصویر 4.2 میں دیئے گئے زلزلی سرگرمیوں اور آتش فشاں کی تقسیم کو دکھانے والے نقشے کا مطالعہ کیجئے۔ آپ بحرالکاہل کے وسطی حصے میں ساحلی خطوط کے متوازی نقطوں کی ایک لکیر دیکھیں گے۔ یہ لکیر آگے بحر ہند میں بھی بڑھ


سمندری فرش کے پھیلاؤ کا تصور

(Concept of Sea Floor Spreading)

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ سرکاؤ کے بعد کے مطالعات سے کافی معلومات



تصویر 4.2 زلزلوں اور آتش فشاں کی تقسیم



تصویر 4.3 : سمندری فرش کی توسیع

5. سمندر کے فرش پر پائی جانے والی گہری کھائیوں میں زلزلے کافی گہرائی میں آتے ہیں جبکہ وسط بحری ستیغ کے علاقے میں زلزلے کے ماسک کم گہرائی پر ہوتے ہیں۔

یہ حقائق اور وسط بحری ستیغ کے دونوں اطراف کی چٹانوں کی مقناطیسی خصوصیات کے تفصیلی تجزیہ کی وجہ سے ہیس (Hess) نے 1961 میں ”سمندری فرش کے پھیلاؤ“ کا مفروضہ پیش کیا۔ ہیس کی دلیل یہ تھی کہ بحری ستیغوں کی چوٹی پر لگاتار آتش فشاں کے پھٹنے سے بحری قشر ٹوٹ گئے اور اس میں نیالاوا (Lawa) گھس گیا جس سے بحری قشر دونوں طرف ہٹ گئے۔ اس طرح سمندری فرش کا پھیلاؤ ہوا۔ بحری قشروں کی کم عمری اور یہ حقیقت کہ ایک سمندر کے پھیلاؤ کی وجہ سے دوسرا سمندر نہیں سکڑتا، کی وجہ سے ہیس نے بحری قشر کی صرف (consumption) کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے مزید یہ کہا کہ بحری فرش جو آتش فشانی فشار کی وجہ سے دھکیل دیا جاتا ہے وہ سمندری کھائیوں میں ڈوب جاتا ہے اور صرف کر لیا جاتا ہے۔ تصویر 4.3 میں سمندری فرش کے توسیع کا بنیادی تصور پیش کیا گیا ہے۔


پلیٹ ٹکٹونکس یا ساختمانی پلیٹ (Plate Tectonics)

سمندری فرش کے پھیلاؤ کے تصور کی شروعات سے بحرا عظموں اور براہعظموں کی تقسیم کے مسئلے میں دلچسپی پھر سے شروع ہو گئی۔ 1967 میں

حاصل ہوئیں جو اس وقت موجود نہیں تھیں جب ویکینر نے براہعظمی سرکاؤ کے تصور کو پیش کیا تھا۔ خاص کر سمندری فرش کی نقشہ نویسی اور سمندری خطوں کی چٹانوں کے قدیمی مقناطیسی مطالعوں سے درج ذیل حقائق سامنے آئے:

1. یہ محسوس کیا گیا کہ وسط بحری ستیغوں کے ساتھ آتش فشاں کا پھٹنا عام ہے جو اس علاقے میں لاوے کی ایک بڑی مقدار لاتے ہیں۔
2. وسط بحری ستیغوں کی چوٹی کے دونوں طرف برابر فاصلے پر واقع چٹانوں کی بناوٹ کے زمانے، کیمیائی ترکیب اور مقناطیسی خصوصیت میں قابل ذکر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وسط بحری سلسلوں سے قریب تر واقع چٹانوں میں طبعی قطبیت پائی جاتی ہے اور یہ نہایت نوخیز ہیں۔ چوٹی سے دوری میں اضافے کے ساتھ چٹانوں کی عمر (age) میں بھی اضافہ پایا جاتا ہے۔
3. سمندری قشر کی چٹانیں براہعظمی چٹانوں کی بہ نسبت زیادہ نوخیز ہیں۔ سمندری قشر کے چٹانوں کی عمر 2 سو ملین سال سے زیادہ نہیں ہے جبکہ کچھ براہعظمی چٹانیں 3 ہزار 2 سو ملین سال پرانی ہیں۔

4. سمندری فرش پر رسوب غیر متوقع طور پر بہت پتلے ہیں جب کہ سائنس دانوں کو یہ امید تھی کہ اگر سمندری فرش اتنے قدیم ہیں جتنا کہ براہعظمی ان پر رسوبوں کی ترتیب لمبے عرصے کی وجہ سے پورے طور پر ہونی چاہئے تھی لیکن کہیں بھی رسوب کا کالم 2 سو ملین سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے۔



تصویر 4.4: ارضیاتی ماضی میں براعظموں کی پوزیشن


پلیٹ کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ زمین کا کرہ جرسات بڑی پلیٹوں اور کچھ چھوٹی پلیٹوں میں منقسم ہے۔ ان بڑی پلیٹوں کے چاروں طرف نئے موڑ دار پہاڑ کی سستیخ، کھائیاں اور یا شگاف ہوتے ہیں۔ (شکل: 4.5)

بڑی پلیٹیں درج ذیل ہیں۔

1. انٹارکٹیکا اور اس کے چاروں طرف کی بحری پلیٹ
2. شمالی امریکی پلیٹ (جس میں مغربی اٹلانٹک فرش شامل ہے اور جو کیریبین جزائر کے ساتھ جنوبی امریکی پلیٹ سے جدا ہوتی ہے)
3. جنوبی امریکی پلیٹ (جس میں مغربی اٹلانٹک فرش شامل ہے اور جو کیریبین جزائر کے ساتھ شمالی امریکی پلیٹ سے جدا ہوتی ہے)
4. بحر الکاہلی پلیٹ
5. ہندوستان۔ آسٹریلیا۔ نیوزی لینڈ والی پلیٹ

میکنزی (Mckenzie)، پارکر (Parker) اور مورگن (Morgan) نے موجود خیالات کو آزادانہ طور پر یکجا کیا اور ایک دوسرے تصور کو پیش کیا جسے پلیٹ ٹکٹونکس کا نام دیا جاتا ہے۔ پلیٹ ٹکٹونکس یا ساختہانی پلیٹ (اسے کرہ جبری پلیٹ بھی کہا جاتا ہے) ایک بڑی ضخامت والی ناہموار شکل کی ٹھوس چٹانوں کی سہل ہے جو عام طور پر بڑی اور بحری کرہ جبر سے بنی ہوئی۔ یہ پلیٹیں افقی سمت میں ٹھوس اکائی کے طور پر کرہ زیر قشر ارض (Asthenosphere) کے اوپر حرکت کرتی رہتی ہیں کرہ جبری میں قشر ارض اور بالائی مینٹل دونوں شامل ہوتے ہیں جن کی موٹائی بحری حصے میں 5 سے 100 کلومیٹر کے درمیان اور بری حصے میں 200 کلومیٹر تک رہتی ہے۔ ایک پلیٹ بڑی بھی ہو سکتی ہے اور بحری بھی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ دونوں میں سے کس میں پایا جاتا ہے۔ بحر الکاہلی پلیٹ بحری پلیٹ ہے جبکہ یوریشیائی پلیٹ بری پلیٹ ہے۔ ساختہانی

PLATE TECTONICS



تصویر 4.5 : دنیا کی بڑی اور چھوٹی پلیٹیں

پلیٹیں ہی ہیں جو حرکت کر رہی ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ارضیاتی ماضی میں بغیر کسی استثناء کے تمام پلیٹوں نے حرکت کی ہے اور آئندہ زمانوں میں بھی اسی طرح حرکت کرتی رہیں گی۔ ویگنر نے سوچا تھا کہ شروع میں تمام بڑا عظیم ایک (Super) سپر بڑا عظیم کی طرح پنچیا (Pangaea) کی شکل میں موجود تھے۔ بہر کیف بعد کی دریافتوں نے یہ ظاہر کیا کہ پلیٹوں پر پڑے براعظمی تودے پورے ارضیاتی عہد میں گھومتے رہے ہیں اور پنچیا مختلف براعظمی تودوں کے امتزاج کا نتیجہ تھا جو کسی نہ کسی پلیٹ کا حصہ تھے۔ سائنس دانوں نے قدیم مقناطیسی اعداد و شمار کا استعمال کر کے مختلف ارضیاتی عہد میں موجود براعظمی تودوں کی پوزیشن کو متعین کیا ہے۔ ناگپور کے علاقے کی چٹانوں کا تجزیہ کر کے برصغیر ہند (زیادہ تر جزیرہ نما ہند) کی پوزیشن کا تعین کیا گیا ہے۔ پلیٹوں کے حدود تین قسم کے ہیں

6. افریقہ مشرقی اٹلانٹک کی فرشی پلیٹ کے ساتھ۔

7. یوریشیا اور متصلہ بحری پلیٹ۔

کچھ اہم چھوٹی پلیٹیں درج ذیل ہیں۔

(1) کوکوس پلیٹ: وسطی امریکہ اور بحر الکاہلی پلیٹ کے درمیان

(2) نزا کا پلیٹ: جنوبی امریکہ اور بحر الکاہلی پلیٹ کے درمیان

(3) عربی پلیٹ: زیادہ تر سعودی عرب کا زمینی تودہ

(4) فلپائن پلیٹ: ایشیائی اور بحر الکاہلی پلیٹ کے درمیان

(5) کیروالان پلیٹ: فلپائن اور ہندوستانی پلیٹ کے درمیان (نیوگنی کے شمال میں)

(6) فیوجی پلیٹ: آسٹریلیا کے شمال مشرق میں

پوری ارضی تاریخ میں یہ پلیٹیں ہی لگا تار گلوب پر حرکت کر رہی ہیں نہ کہ بڑا عظیم جیسا کہ ویگنر نے سوچا تھا۔ سبھی براعظم پلیٹ کا ہی حصہ ہیں اور یہ

ابھاری شرح سب سے زیادہ ہے (سالانہ 15 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ)

پلیٹوں کی حرکت کے لئے قوت

(Force for the Plate Movement)

جس وقت ویکٹر نے اپنا ”برا اعظمی سر کا وجود“ کا نظریہ پیش کیا تھا، زیادہ تر سائنس دان زمین کو ایک ٹھوس بغیر حرکت والا وجود مانتے تھے۔ حالانکہ سمندری فرش کے پھیلاؤ کا تصور اور پلیٹ ساختہانی کے متحدہ نظریات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سطح زمین اور اندرون زمین دونوں ہی جامد نہیں ہیں بلکہ محرک ہیں۔ یہ حقیقت کہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں ایک مسلمہ امر ہے۔ ٹھوس پلیٹوں کے نیچے کی متحرک چٹانیں دوری (Circular) طور پر حرکت کرتی ہوئی مانی جاتی ہیں۔ گرم مادے سطح تک اٹھتے ہیں، پھیلتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں اور پھر واپس گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دور بار بار دہرایا جاتا ہے جس سے سائنس دانوں کے مطابق حملی سیل یا حملی رو پیدا ہوتی ہے۔ زمین کے اندر کی حرارت دواہم ذریعوں سے آتی ہے: تابکاری کے ٹکڑے اور باقی ماندہ حرارت سے۔ 1930 کے عشرہ میں آر تھر ہومز نے اس خیال پر پہلی بار غور کیا۔ بعد میں اس خیال نے سمندری فرش کے پھیلاؤ سے متعلق ہیری ہیس (Harry Hess) کی فکر کو متاثر کیا۔ ٹھوس پلیٹوں کے نیچے پڑے گرم ہزمینٹل کی سست روی ہی پلیٹوں کی حرکت کو چلانے والی قوت ہے۔

ہندوستانی پلیٹ کی حرکت

(Movement of the Indian Plate)

ہندوستانی پلیٹ میں جزیرہ نما ہند اور براعظم آسٹریلیا کے حصے شامل ہیں۔ ہمالیہ کے ساتھ مغلوب منطقہ (Subduction zone)۔ براعظمی امتزاج کی شکل میں اس پلیٹ کی شمالی سرحد بناتا ہے۔ مشرق میں یہ میانمار کے راکن یو ما پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جاوا کھائی کے ساتھ جزیرائی محراب تک پھیلا ہے۔ مشرقی کنارہ ایک توسیعی مقام ہے جو جنوب مغربی بحر الکاہل میں بحری ستیغوں کی شکل میں آسٹریلیا کے مشرق میں پڑتا ہے۔ مغربی کنارہ پاکستان میں کرتھار (Kirthar) پہاڑ کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ آگے مکرانا کے ساحل تک بڑھتے ہوئے بحر احمر کے شکاف سے چاگوس مجمع الجزائر کے

انتشاری سرحدیں (Divergent Boundaries)

یہ وہ سرحدیں ہیں جہاں پلیٹیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں تو نئی قشر وجود میں آتی ہے۔ وہ جگہ جہاں سے پلیٹیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں اسے توسیعی جگہ کہا جاتا ہے۔ انتشاری سرحد کی بہترین مثال وسط اٹلانٹک بحری ستیغ ہے۔ یہاں پر امریکی پلیٹیں یوریشیائی اور افریقی پلیٹوں سے الگ ہوتی ہیں۔

امتزاجی سرحدیں (Convergent Boundaries)

یہ وہ سرحدیں ہیں جہاں ایک پلیٹ کے دوسری پلیٹ کے نیچے کی جانب چلے جانے سے قشر برباد ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے نیچے ڈوبتی ہے اسے مغلوب منطقہ (Subduction zone) کہتے ہیں۔ تین طریقے سے امتزاج ہو سکتا ہے۔ (1) بحری اور بری پلیٹ کے درمیان؛ (2) دو بحری پلیٹوں کے درمیان؛ اور (3) دو بری پلیٹوں کے درمیان۔

متغیر سرحدیں (Transform Boundaries)

یہ وہ سرحدیں ہیں جہاں پلیٹیں افقی طور پر ایک دوسرے پر پھسلتی ہیں تو نہ کوئی نیا قشر بنتا ہے اور نہ ہی برباد ہوتا ہے۔ متغیرہ شکاف جدائی کی وہ سطح ہے جو عموماً وسط بحری ستیغوں کے عمود پر ہوتی ہے۔ چونکہ پوری چوٹی پر آتش فشاں کا پھٹنا ایک ساتھ نہیں ہوتا اس لئے زمین کے محور سے دور پلیٹ کے حصے میں تفرقی حرکت ہوتی ہے۔ پلیٹ کے جدا ہوئے حصے پر زمین کی گردش کا بھی اثر پڑتا ہے۔

آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پلیٹوں کی حرکت کی شرح کیسے متعین کی جاتی ہے؟

پلیٹ کی حرکت کی شرح


(Rates of Plate Movement)

وسط بحری ستیغوں کے متوازی عمومی اور معکوس مقناطیسی فیلڈ کی پٹی سائنس دانوں کو پلیٹ کی حرکت کی شرح متعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ شرحیں کافی حد تک علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ آرٹک سٹیغ کی شرح سب سے کم ہے (سالانہ 2.5 سینٹی میٹر سے بھی) اور جنوبی بحر الکاہل میں چلی (Chile) کے مغرب میں تقریباً 3400 کلومیٹر کی دوری پر، جزیرہ ایسٹر کے پاس مشرقی بحر الکاہل ابھار کی شرح سب سے زیادہ ہے (سالانہ 15 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ)

طبعی جغرافیہ کے مبادیات

جنوب کی طرف توسیعی مقام سے ملتا ہے۔ ہندوستان اور انٹارکٹک پلیٹ کے درمیان کی سرحد بھی بحری ستیج (انتشاری سرحد) ہے جو تقریباً مشرقی اور مغربی سمت ہوتے ہوئے، نیوزی لینڈ کے تھوڑے جنوب میں توسیعی مقام میں مل جاتی ہے۔

ہندوستان پہلے ایک بڑا جزیرہ تھا جو آسٹریلیائی ساحل سے دور وسیع سمندر میں واقع تھا۔ ٹیٹھس (Tethys) سمندر نے اسے تقریباً 225 ملین سالوں تک براعظم ایشیا سے الگ رکھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہندوستان نے 200 ملین سال قبل شمال کی طرف اس وقت بڑھنا شروع کیا جب پنجیا ٹوٹا تھا۔ ہندوستان 40 سے 50 ملین سال قبل ایشیا سے ٹکرایا جس کی وجہ سے ہمالیہ تیزی سے اوپر اٹھنے لگا۔ تقریباً 71 ملین سال قبل سے لیکر موجودہ وقت تک ہندوستان کی پوزیشن کو تصویر 4.6 میں دکھایا گیا ہے۔ تقریباً آج سے 140 ملین سال قبل تک برصغیر جنوب کی جانب 50° جنوبی عرض البلد پر واقع تھا۔ دونوں بڑی پلیٹیں ٹیٹھس سمندر سے الگ تھیں اور تبتی کا بلاک ایشیائی زمینی تودے سے زیادہ قریب تھا۔ ہندوستانی پلیٹ کی ایشیائی پلیٹ کی طرف حرکت کرنے کے دوران ایک بڑا واقعہ رونما ہوا وہ تھا لاوے (Lawa) کا ٹکنا اور دکن ٹریپ کا بننا۔ یہ تقریباً 60 ملین سال قبل شروع ہوا اور ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برصغیر اس وقت بھی خطہ استواء سے قریب تھا۔ 40 ملین سال قبل اور اس کے بعد ہمالیہ کے بننے کا واقعہ شروع ہوا۔ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ عمل اب بھی جاری ہے اور ہمالیہ کی بلندی آج کی تاریخ میں بھی بڑھ رہی ہے۔



تصویر 4.6: ہندی پلیٹ کی حرکت

مشق

1. کثیر انتخابی سوالات

(i) مندرجہ ذیل سب سے پہلے کس نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ یورپ، افریقہ اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ واقع تھے۔

- (الف) الفریڈ ویکینر
(ب) انٹونیو پیلیگرینی
(ج) ابراہم آرٹیس
(د) ایڈمنڈ ہیس

(ii) قطبی فراری قوت کا تعلق مندرجہ ذیل میں سے کس سے ہے۔

- (الف) زمین کی مداری گردش سے
(ب) زمین کی محوری گردش سے

(ج) قوت ثقل سے (د) مدوجزر سے

(iii) درج ذیل میں کون چھوٹی پلیٹ نہیں ہے؟

(الف) نزکا (ب) عربی

(ج) فلپائن (د) انٹارکٹیکا

(iv) درج ذیل میں کس حقیقت کو بحری فرش کے پھیلاؤ کے تصور میں جگہ نہیں دی گئی تھی؟

(الف) وسطی بحری ستیخوں کے ساتھ آتش فشانی سرگرمی

(ب) بحری فرش کی چٹانوں میں عمومی اور معکوسی مقناطیسی فیلڈ کا مشاہدہ

(ج) مختلف براعظموں میں رکاز کی تقسیم

(د) بحری فرش کی چٹانوں کی عمر

(v) ہمالیائی پہاڑ کے ساتھ ہندوستانی پلیٹ کی سرحد درج ذیل میں کس قسم کی سرحد ہے؟

(الف) بحر اعظمی۔ براعظمی امتزاج (ب) انتشاری سرحد (ج) متغیرہ سرحد (د) براعظمی۔ براعظمی امتزاج

2. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب تقریباً 30 الفاظ میں دیں۔

(i) براعظموں کو حرکت دینے کے لئے ویکٹرز نے کن قوتوں کو ذمہ دار بتایا ہے؟

(ii) مینٹل میں جمالی روکس طرح شروع ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے؟

(iii) پلیٹوں کی متغیرہ سرحد اور امتزاجی یا انتشاری سرحدوں میں اہم فرق کیا ہے؟

(iv) دکن ٹریپ کے بننے کے دوران ہندوستانی زمینی تودے کا محل وقوع کیا تھا؟

3. درج ذیل سوالوں کے جواب تقریباً 150 الفاظ میں دیں۔

(i) نظریہ براعظمی سرکاؤ کی تائید میں کیا ثبوت ہیں؟

(ii) براعظمی سرکاؤ اور پلیٹ ساختہانی کے درمیان بنیادی فرق کی وضاحت کریں۔

(iv) سرکاؤ کے بعد کی اہم دریافت کیا ہیں جس کی وجہ سے بحر اعظموں اور براعظموں کی تقسیم کے مطالعہ میں سائنس دانوں کی

دلچسپی از سر نو پیدا ہوئی۔

پروجیکٹ کا کام

زلزلے سے پیدا شدہ تباہیوں سے متعلق ایک کولاج بنائیے۔