

1

حقیقی اعداد (REAL NUMBERS)

1.1 تعارف

نویں کلاس میں آپ نے حقیقی اعداد اور غیر ناطق کی دنیا کے مطالعے کا آغاز کیا۔ اس باب میں ہم حقیقی اعداد کا مطالعہ جاری رکھیں گے، ہم سیکشن 1.2 اور 1.3 کو ثابت صحیح اعداد کی دو ہم خصوصیات سے شروع کریں گے جو ہماں اقلیدیس کا تقسیم کا الگوریتم اور حساب کا بنیادی مسئلہ ہے۔

اقلیدیس کی تقسیم کا الگوریتم جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے، صحیح اعداد کی تقسیم سے متعلق ہے جس کے مطابق کسی ثابت صحیح اعداد a کو دوسرے ثابت صحیح عدد b سے اس طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے کہ a باقی پچھے اور b سے چھوٹا ہو۔ آپ میں سے بہت سے طلباء اس کو لمبی تقسیم کی حیثیت سے پہچانتے ہیں حالانکہ یہ نتیجہ سمجھنے اور بیان کرنے میں کافی آسان ہے: صحیح اعداد کی تقسیمی خصوصیات سے متعلق اس کے بہت سے استعمال ہیں۔ اس میں سے چند ہی کے بارے میں ہم اس باب میں مطالعہ کریں گے اور خاص طور سے اس کا استعمال ہم دو ثابت صحیح اعداد کا [دواضعاف اقل مشترک (HCF)] معلوم کرنے میں کریں گے۔

دوسری طرف حساب کے بنیادی مسئلے کا تعلق ثابت صحیح اعداد کی ضرب سے ہے۔ آپ پہلے سے ہی واقف ہیں کہ ہر ایک مرکب عدد کو ایک مخصوص طریقے سے مفرد اعداد کے حاصل ضرب کی شکل میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یہ اہم حقیقت ہی حساب کا بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ نتیجہ بھی سمجھنے اور بیان کرنے میں کافی آسان ہے۔ اور ریاضی کے میدان میں اس کے دور رس اور اہم استعمالات ہیں، ہم حساب کے بنیادی مسئلے کا استعمال دو خاص چیزوں میں کریں گے، پہلے ہم نویں کلاس میں پڑھے گئے اعداد کی غیر ناطقیت کو ثابت کرنے میں اس کا استعمال کریں گے، جیسے $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ اور $\sqrt{5}$ اور پھر اس کا استعمال یہ جانے کے لیے کریں گے کہ کب ناطق عدد ($0 \neq \frac{p}{q}$) کا عشری اظہار مختتم ہے اور کب غیر مختتم اور تکراری ہے اور ایسا ہم $\frac{p}{q}$ کے نسب نما

q کے مفرد اجزاء ضربی کو دیکھ کر کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ q کے مفرد اجزاء ضربی $\frac{p}{q}$ کے عشری پھیلاؤ کے بارے میں حتیٰ بات بتاتے ہیں۔
آئیے اب ہم اپنے مطالعے کو شروع کرتے ہیں۔

1.2 اقلیدس کا معادنہ

مندرجہ ذیل لوک پہلی پر غور کیجئے*

ایک تاجر ایک سڑک کے کنارے انڈے بیٹھا ہوا جا رہا تھا، ایک بیکار آدمی جس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، اس تاجر سے بدکلامی کرنے لگا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اس نے اس ٹوکری کو جس میں انڈے تھے زمین پر چینک دیا، جس کی وجہ سے تاجر کے سارے انڈے ٹوٹ گئے، تاجر نے پنچاہیت سے انجام کی کہ وہ اس آدمی سے اس کے انڈوں کے پیے دلوائے، پنچاہیت تاجر سے پوچھتی ہے کہ اس کے کتنے انڈے ٹوٹے، اس نے مندرجہ ذیل جوابات دئے:

اگر جوڑوں میں گنا جائے تو، ایک باقی بچے گا؛
اگر تین، تین کر کرے گنا جائے تو دو باقی بچیں گے؛
اگر چار، چار کر کرے گئے جائیں تو تین باقی بچیں گے؛
اگر پانچ پانچ کر کرے گئے جائیں تو چار باقی بچیں گے؛
اگر چھ چھ کر کرے گئے جائیں تو پانچ باقی بچیں گے؛
اگر سات سات کر کرے گئے جائیں تو کچھ باقی نہیں بچتا؛
میری ٹوکری میں 150 سرے زیادہ انڈے نہیں آسکتے۔

بتائیے اس ٹوکری میں کل کتنے انڈے تھے؟ آئیے ہم اس پہلی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مان یعنی انڈوں کی تعداد a ہے۔ پہلی کے مطابق a تو 150 سے کم ہے یا ابرا:

اگر سات سات میں گنتے ہیں تو کچھ باقی نہیں بچتا جس کا حساب کی زبان میں مطلب ہے $0 = 7p + a$ جہاں P کوئی طبعی عدد ہے۔ اگر چھ چھ کر کے گئیں تو $5q + a = 150$

اگر پانچ پانچ کر کے گئیں تو $4w + a = 150$ باقی بچتا ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں $w = 4, a = 5w + 4$ جہاں w کوئی طبعی عدد ہے۔
اگر چار چار کر کے گئیں تو $3s + a = 150$ باقی بچتا ہے اس کا مطلب ہے $s = 48, a = 3s + 3$ جہاں s کوئی طبعی عدد ہے۔

* رام پال اور دیگر حضرات کے! Numeracy Counts، (عددی شماریات) میں شامل پہلی کی یہ جدید شکل ہے۔

اگر تین تین میں گنسیں تو دو باقی بچتا ہے اس کا مطلب ہے، $2t + a = 3t$ جہاں t کوئی طبی عدد ہے۔
 اگر جوڑوں میں گنتے ہیں تو ایک باقی بچتا ہے اس کا مطلب ہے، $2u + a = 2u$ جہاں u کوئی طبی عدد ہے۔
 یعنی ہر حالت میں ہمارے پاس ہوتا ہے a اور ایک ثابت صحیح عدد b (ہماری مثال میں b کی قدریں بالترتیب 7، 6، 5، 4، 3، اور 2 میں) جو a کو تقسیم کر کے باقی r (ہماری مثال میں 0، 3، 4، 5، 6، 7 اور 1) جو b سے چھوٹا ہے، جس لمحہ ہم ایں مساویں لکھتے ہیں، ہم اقلیدس کے تقسیم کے معاونہ کا استعمال کرتے ہیں جو مسئلہ 1.1 میں دیا ہوا ہے۔
 واپس ہم اپنی پہلی کی طرف آتے ہیں، کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح حل کریں گے؟ ہاں! ہم 7 کے ایسے اضعاف پر غور کریں گے، جو تمام شرطوں کو مطمئن کریں، سمجھی و خطاط کی مدد سے اس کو معلوم ہو گا کہ اس کے پاس 119 اندلے تھے۔

اس بات کو محسوس کرنے کے لئے اقلیدس کا تقسیم کا معاونہ کیا ہے۔ مندرجہ ذیل صحیح اعداد کے جوڑوں پر غور کیجئے

$$17,6; \quad 5,12; \quad 20,4;$$

مذکورہ بالامثال کی طرح ہم ایسے ہر ایک جوڑے کے لئے ہم مندرجہ ذیل تعلق (relations) لکھتے ہیں

$$(17=6 \times 2 + 5)$$

$$(5=4 \times 1 + 1)$$

$$(20=4 \times 5 + 0)$$

یعنی ہر ایک ثابت صحیح اعداد a اور b کے لئے ہمارے پاس q اور r ایسے صحیح اعداد ہیں جو درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

نوٹ کیجئے کہ r یا q صفر بھی ہو سکتا ہے۔

آپ مندرجہ ذیل ثابت صحیح اعداد a اور b کے لئے صحیح اعداد a اور b معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟

$$(i) 10, 3; \quad (ii) 4, 19; \quad (iii) 81, 3$$

کیا آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ q اور r کیا ہیں؟ یہی صرف ایسے صحیح اعداد میں جو شرط $a = bq + r$ کو مطمئن کرتے ہیں جہاں $b < r \leq 0$ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہو گا آپ اتنے سالوں سے جو لمبی تقسیم کر رہے ہیں اس کی یہ دوسری شکل ہے اور صحیح اعداد q اور r بالترتیب خارج تسلیم اور باقی کہلاتے ہیں اس نتیجے کا ایک رسی بیان مندرجہ ذیل ہے۔

مسئلہ 1.1: (اقلیدس کی تقسیم کا معاونہ) ثابت صحیح اعداد a اور b کے لئے ایسے دو منفرد صحیح اعداد موجود ہوتے ہیں جو $b < r$ اور $r = bq + r$, $0 \leq r < b$ کو مطمئن کرتے ہیں۔

اس نتیجہ کا اکشاف بہت پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن سب سے پہلے اس کو اقلیدس کے عناصر کی کتاب VII میں ریکارڈ کیا گیا، اقلیدس کا تقسیم کا الگوریتم کی بنیاد اس معاونہ پر ہے۔



ایک الگوریتم صحیح ڈھنگ سے معرف اقدام کا وہ سلسلہ ہے جس سے کسی قسم کے مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ لفظ الگوریتم نویں صدی کے ایرانی ریاضی وال الخوارزمی کے نام سے اخذ کیا گیا ہے درحقیقت، لفظ الجبرا بھی اس کی لکھی گئی کتاب حساب الجبرا المقابلہ سے اخذ کیا گیا ہے، معاونہ ایک ایسا ثابت شدہ بیان ہے جس کا استعمال کسی دوسرے بیان کو ثابت کرنے میں کیا جاتا ہے۔

محمد بن موسی الخوارزمی
(A.D. 780 - 850)

اقلیدس کا تقسیم الگوریتم دیے ہوئے دو ثابت صحیح اعداد کا [اعداد عظم مشترک (HCF)] معلوم کرنے کی ایک تکنیک ہے یاد کیجئے کہ دو ثابت صحیح اعداد a اور b کا HCF (اعداد عظم مشترک) وہ عظم ثبت صحیح عدد d ہے جو a اور b دونوں کی تقسیم کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے لئے ہم ایک مثال لیتے ہیں مان لیجئے ہمیں صحیح اعداد 455 اور 42 کا HCF (اعداد عظم مشترک) معلوم کرنا ہے، ہم بڑے تھج عدیجنی 455 سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم اقلیدس کے معاونہ کا استعمال کرتے ہیں، اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$455 = 42 \times 10 + 35$$

اب مقسوم علیہ 42 اور باقی 35 پر غور کیجئے اور مندرجہ ذیل حاصل کرنے کے لئے تقسیم کے معاونہ کا استعمال کیجئے

$$42 = 35 \times 1 + 7$$

اب مقسوم علیہ 35 اور باقی 7 پر غور کیجئے اور $35 = 7 \times 5 + 0$ حاصل کرنے کے لئے تقسیم کے معاونہ کا استعمال کیجئے۔ نوٹ کیجئے کہ باقی صفر ہو گیا ہے اس لئے ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 455 اور 42 کا HCF اعداد عظم اس

مرحلہ پر مقصوم علیہ ہے یعنی 7۔ اس کی تصدیق آپ 455 اور 42 کے تمام اجزاءے ضربی کی فہرست بنائ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کس لئے کام کرتا ہے؟ یہ مندرجہ ذیل نتیجے کی وجہ سے کام کرتا ہے۔
اس لئے آئیے اقلیدس کی تقسیم کے الگوریتم کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔

دو مشتبہ صحیح اعداد مان لیجئے c اور d ، جہاں $c > d$ کا HCF عاد اعظم مشترک حاصل کرنے کے لئے ہم مندرجہ ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

قدم 1: c اور d پر اقلیدس کی تقسیم کے معاونہ کا استعمال کیجئے، اس طرح ہمیں مکمل اعداد q اور r ایسے ملتے ہیں کہ

$$c = dq + r, \quad 0 \leq r < d.$$

قدم 2: اگر $r = 0$ تو c اور d کا HCF عاد اعظم کا مشترک ہے اگر $r \neq 0$ تو d اور r پر تقسیم کے معاونہ کا استعمال کیجئے۔

قدم 3: اس عمل کو جاری رکھیے جب تک کے باقی صفر ہو جائے، اس مرحلہ پر مقصوم علیہ مطلوبہ HCF عاد اعظم مشترک ہو گا یہ الگوریتم کا کام کرتا ہے کیونکہ $HCF(c, d) = HCF(d, r)$ جہاں علامت (c, d) اور (d, r) کے HCF کو ظاہر کرتا ہے۔
مثال 1: اقلیدس کے الگوریتم کا استعمال کر کے 4052 اور 676 کا HCF عاد اعظم مشترک معلوم کیجئے۔

حل:

قدم 1: کیونکہ $4052 > 676$ اور $676 > 420$ پر تقسیم کے معاونہ کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے،

$$12576 = 4052 \times 3 + 420$$

قدم 2: کیونکہ باقی $420 \neq 0$ اور $420 > 272$ پر تقسیم کے معاونہ کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$4052 = 420 \times 9 + 272$$

قدم 3: ہم نے مقصوم علیہ 420 اور باقی 272 پر غور کرتے ہیں اور تقسیم کے معاونہ کے استعمال کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$420 = 272 \times 1 + 148$$

ہم نے قاسم 272 اور باقی 148 پر غور کرتے ہیں اور تقسیم کے معاونہ کا استعمال کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$272 = 148 \times 1 + 124$$

ہم نے مقصوم علیہ 148 اور باقی 124 پر غور کرتے ہیں اور تقسیم کے معاونہ کا استعمال کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$148 = 124 \times 1 + 24$$

ہم نے مقسوم علیہ 124 اور نئے باقی 24 پر غور کرتے ہیں اور تقسیم کے معاونہ کے استعمال کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$124 = 24 \times 5 + 4$$

اب ہم نے مقسوم علیہ 24 اور نئے باقی 4 پر غور کرتے ہیں اور نئے معاونہ کے استعمال کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$24 = 4 \times 6 + 0$$

اب باقی صفر ہو گیا اس لئے ہمارا طریقہ (الگورنٹم) رک جاتا ہے کیونکہ اس مرحلہ پر مقسوم علیہ 4 ہے اس لئے 12576

اور 4 HCF کا 4052 ہے۔

$$4 = \text{HCF} (24, 4) = \text{HCF} (124, 24) = \text{HCF} (148, 124)$$

$$\text{HCF} (272, 148) = \text{HCF} (420, 272) = \text{HCF} (4052, 420) = \text{HCF} (12576, 4052).$$

اقلیدس کی تقسیم کا معاونہ نہ صرف بڑے اعداد کا HCF عاد اعظم مشترک معلوم کرنے میں مفید ہے بلکہ یہ کسی الگورنٹم کی وہ

پہلی مثال ہے جس کو حل کرنے کے لئے کمپیوٹر نے پروگرامنگ کی۔

رائے زنی

1۔ اقلیدس کی تقسیم کا معاونہ اور الگورنٹم اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ لوگ اکثر معاونہ کو تقسیم کا الگورنٹم کہتے ہیں۔

2۔ حالانکہ اقلیدس کی تقسیم کا الگورنٹم صرف ثابت صحیح اعداد کے لئے بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کی توسعہ ہم صفر کے علاوہ تمام صحیح اعداد یعنی $a \neq b$ کے لئے کر سکتے ہیں، اس باب میں ہم اس پہلو پر غور نہیں کریں گے۔

اقلیدس کی تقسیم کے معاونہ الگورنٹم کے اعداد کی خصوصیات معلوم کرنے سے متعلق بہت سے متعلق ہم صرف کے علاوہ تمام صحیح اعداد میں دیے گئے ہیں۔

مثال 2: دکھائیے کہ ہر ثابت صحیح عدد $2q$ شکل کا ہوتا ہے اور ہر ثابت طاقت عدد $1+q^2$ کی شکل کا ہوتا ہے جہاں q کوئی

صحیح عدد ہے۔

حل: مان لیجئے a کوئی ثابت صحیح عدد ہے اور $b=2$ تب اقلیدس کے الگورنٹم کے مطابق $a=2q+r$ کسی صحیح عدد ≥ 0

کے لئے اور $r=0$ یا $r=1$ کیونکہ $2 \geq r < 0$ اس لئے

اگر $a=2q$ کی شکل کا ہے تو ایک جفت صحیح عدد ہے۔ مزید ایک ثابت صحیح عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاقت۔ اس لئے

کوئی بھی ثابت طاقت عدد $1+2q$ کی شکل کا ہوتا ہے۔

مثال 3: دکھائیے کوئی بھی ثابت طاقت صحیح عدد $1+4q+3q^2+4q^3$ یا $4q+3$ کی شکل کا ہوتا ہے جہاں q کوئی صحیح عدد ہے۔

حل: آئیے شروعات لے کر تے ہیں جہاں a ثابت طاق عدد ہے، ہم اور $b = 4$ پر تقسیم الگوریتم کا استعمال کرتے ہیں

کیونکہ $4 \leq r < 0$ ممکنہ باقی ہیں، ۰، ۱، ۲ اور ۳

لیعنی a ہو سکتا ہے، یا $4q + 3$ یا $4q + 2$ یا $4q + 1$ یا $4q$ جہاں q خارج قسمت ہے۔

لیکن، a یا $4q + 3$ نہیں ہو سکتا کیونکہ a طاق ہے (کیونکہ دونوں 2 سے تقسیم ہوتے ہیں) اس لئے کوئی بھی طاق صحیح عدد $+1$ یا $4q + 3$ کی شکل کا ہوتا ہے۔

مثال 4: ایک حلوانی کے پاس 420 کا جو کی برنسی اور 130 بادام کی برنسی ہے۔ وہ برنسی کو قطاروں میں اس طرح لگانا چاہتا ہے کہ ہر قطار میں برنسی کی تعداد یکساں ہو اور ٹرے کام کے کم رقبہ استعمال ہو اس مقصد کے لئے ہر قطار میں کتنی برنسیاں ہوں گی؟

حل: اس مسئلہ کو ہم Trial and error سعی و خط کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو منظم طور پر کرنے کے لئے ہم HCF (420, 130) کا عالم مشرک معلوم کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس عدد (HCF) سے ہمیں ہر قطار میں موجود برنسی کی وہ اعظم تعداد ملے گی جس کی وجہ سے قطاروں کی تعداد کم سے کم ہو۔ اور اسی حالت میں ٹرے کا رقبہ کم سے کم استعمال ہوگا۔

آئیے، اب اقلیدیس کے الگوریتم کا استعمال HCF معلوم کرنے میں کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے

$$420 = 130 \times 3 + 30$$

$$130 = 30 \times 4 + 10$$

$$30 = 10 \times 3 + 0$$

اس طرح سے 420 اور 130 کا HCF 10 ہے

اس طرح سے حلوانی دونوں قسم کی برنسیوں کی 10، 10، 10 کی قطاریں بنائے گا۔

مشق 1.1

1۔ اقلیدیس کی تقسیم کے الگوریتم کا استعمال کر کے مندرجہ ذیل کا HCF معلوم کیجئے۔

(i) 135 اور 255

(ii) 38220 اور 196

(iii) 225 اور 867

2۔ دکھائیے کہ کوئی بھی ثابت طاق صحیح عدد $1, 3, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5$ یا $6q + 6$ کی شکل کا ہوتا ہے جہاں q کوئی صحیح عدد ہے۔

3۔ ایک پریڈ میں 616 افراد کی فوج کے ایک دستے کو 32 افراد کے ایک فوجی بندی کے پیچے چلتا ہے۔ دونوں گروپوں کو

کالموں کی یہ سال تعداد میں مارچ کرتا ہے۔ کالموں کی وہ بڑی سے بڑی تعداد معلوم کیجئے جس میں وہ مارچ کر سکتے ہیں؟

- 4۔ اقلیدس کے تقسیم کے معاونہ کا استعمال کر کے دکھائیے کہ کسی ثابت صحیح عدد کا مرلیع یا تو $3m+1$ یا $3m+3$ کی شکل کا ہوگا جہاں m کوئی صحیح عدد ہے۔

[اشارہ:- مان لیجئے x کوئی ثابت صحیح عدد ہے تب یہ $1, 3q+1$ یا $3q+2$ یا $3q+3$ کی شکل کا ہوگا۔ اب ان سب کا مرلیع نکالیے اور دکھائیے کہ کسی بھی ثابت صحیح عدد کا مرلیع $3m+1$ یا $3m+3$ کی شکل کا ہوگا۔]

- 5۔ اقلیدس کے تقسیم کے معاونہ کا استعمال کر کے دکھائیے کہ کسی بھی ثابت صحیح عدد کا کعب $9m+8$ یا $9m+9$ یا $9m+10$ کی شکل کا ہوگا۔

1.3 حساب کا بنیادی مسئلہ

سابقہ کلاسوں میں آپ دیکھے چکے ہیں کہ کسی بھی طبعی عدد کو آپ اس کے مفرد اجزاء ضربی کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر $2 = 2 \times 2$ ، $4 = 2 \times 2 \times 2$ اور $23 = 11 \times 2$ اور آگے تک، آئیے اب ہم طبعی عدد کو ایک دوسرے نظریہ سے دیکھتے ہیں یعنی کیا کسی طبعی عدد کو مفرد اعداد کی ضرب کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔

مفرد اعداد کا کوئی بھی مجموعہ لیجئے جیسے $2, 3, 7, 11, 23$ اور 23 ، اگر ہم ان میں کچھ یا تمام اعداد کو ضرب کریں، جس میں اعداد کی تکرار کی کوئی قید نہیں ہو، تو ہم ثابت صحیح اعداد کا ایک بہت بڑا مجموعہ حاصل کر سکتے ہیں (درحقیقت لاحدہ ود) آئیے ان میں سے کچھ کی فہرست مندرجہ ذیل میں بتاتے ہیں۔

$$7 \times 11 \times 23 = 1771$$

$$3 \times 7 \times 11 \times 23 = 5313$$

$$2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 10626$$


$$2^3 \times 3 \times 7^3 = 8232$$

$$2^2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 21252$$

وغیرہ

اب فرض کر لیجئے کہ آپ کے مفرد اعداد کے مجموعہ میں تمام ممکنہ مفرد اعداد شامل ہیں۔ اس مجموعہ کے سائز کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا اس میں محدود صحیح اعداد ہیں یا لاحدہ ود؟ درحقیقت اس میں لاحدہ و مفرد اعداد ہیں۔ اس لئے اگر ہم ان تمام مفرد اعداد اور ان کے تمام ممکنہ حاصل ضربوں پر مشتمل کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس طریقہ سے تمام مرکب اعداد بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسا مرکب عدد ہو سکتا ہے جو مفرد اعداد کی قوتوں (Power) کا حاصل ضرب نہ ہو؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں آئیے ثابت صحیح اعداد کے اجزاء ضربی بنا کیں

لیعنی اس سے قبل جو ہم نے کیا ہے اس کا برعکس کریں۔
 ہم اجزاء ضربی کے درخت کا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ سب پہلے ہی سے واقف ہیں۔ آئیے کوئی بڑا عدد مان لیجئے۔ 32760 لیتے ہیں اور اس کے اجزاء ضربی معلوم کرتے ہیں جیسا کہ ذیل شکل میں دکھایا گیا ہے۔



اس طرح سے ہم نے 32760 کے اجزاء ضربی مفرد اعداد کے حاصل ضرب $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$ کی شکل میں معلوم کیجئے یعنی $32760 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$ یہ مفرد اعداد کی قوتوں کے حاصل ضرب کی شکل ہے۔ آئیے ایک دوسرا عدد لیتے ہیں جیسے 123456789 اس کو ہم 3803×3607 کی طرح لکھ سکتے ہیں بے شک آپ کو جانچ کرنا ہو گا کہ اس کو آپ خود دوسرے بہت سے طبعی اعداد کے لئے کوشش کیجئے) اس سے ہمیں ایک 3803 اور 3607 مفرد ہیں! (اس کو آپ خود دوسرے بہت سے طبعی اعداد کے لئے کوشش کیجئے) اس سے ہمیں ایک (قياس) حاصل ہوتا ہے کہ ہر مرکب عدد کو مفرد اعداد کی قوتوں کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ Conjecture

درحقیقت یہ بیان صحیح ہے اور اسے ہم حساب کا بنیادی مسئلہ کہتے ہیں کیونکہ صحیح اعداد کے مطالعہ کے لئے اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ آئیے اب ہم کسی طور پر اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ 1.2 حساب کا بنیادی مسئلہ (Fundamental Theorem of Arithmetic) :- ہر مرکب عدد کو مفرد اعداد کے حاصل ضرب اجزاء ضربی کی شکل میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یہ اجزاء ضربی میں (تحلیل) اظہار منفرد ہوتا ہے۔ بھلے ہی مفرد اجزاء ضربی کی ترتیب مختلف ہو۔

حساب کے بنیادی مسئلے کے مطابق ہر مرکب عدد کو مفرد اعداد کے حاصل ضرب کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ درحقیقت اس میں بھی زیادہ اس مسئلے کی رو سے دیے ہوئے کسی مرکب عدد کے اجزاء ضربی ایک مخصوص (منفرد) طریقے سے مفرد اعداد کے حاصل ضرب کی شکل میں بنائے جاسکتے ہیں۔ سوائے اس ترتیب کے جس میں مفرد اعداد واقع ہوتے ہیں یعنی کسی بھی دیے ہوئے مرکب کو ایک اور صرف ایک ہی طریقے سے مفرد اعداد کے حاصل ضرب کے طور پر لکھا جاسکتا ہے۔ جب تک کہ ہم اس کے مفرد اعداد کی ترتیب پر غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم $7 \times 5 \times 3 \times 2$ اور $2 \times 5 \times 7 \times 3$ کو ایک ہی سمجھتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کسی ترتیب میں ہوں۔ اس حقیقت کو ہم مندرجہ ذیل شکل میں بیان کرتے ہیں۔

طبعی اعداد کی مفرد اجزاء ضربی میں تحلیل منفرد (ایکتا) ہے سوائے اس کے اجزاء ضربی کی ترتیب کے۔

عمومی طور پر ایک دیے ہوئے مرکب عدد x کے ہم اجزاء ضربی معلوم کرتے ہیں۔ $x = p_1 p_2 \dots p_n$ جہاں،



کارل فریڈرک گاس
(1777-1855)

مسئلہ 1.2 کا معادل بیان سب سے پہلے اقلیدس کے عناصر کی کتاب IX میں موضوعہ 14 کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بعد میں اسے حساب کے بنیادی مسئلہ کے طور پر جانا جانے لگا۔ لیکن اس کا پہلا صحیح ثبوت کارل فریڈرک گاس نے (Disquisitiones Arithmeticae) میں دیا۔ گاس کو اکثر ریاضی کے شہزادے کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کا نام بھی تک کے دنیا کے 3 بڑے ریاضی دانوں میں شامل ہوتا ہے۔ فریڈرک گاس، نیوٹن (Newton) اور ارشمیدس (Archimedes) وغیرہ۔ انہوں نے سائنس اور ریاضی میں بنیادی تعاون دیا ہے۔

ہیں جو بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھے ہیں۔ یعنی $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_n$ اگر ہم یکساں مفرد اعداد کو ملائیں تو ہمیں مفرد اعداد کی قوت حاصل ہوگی مثال کے طور پر،

$$32760 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$$

جب ہم نے ایک بار طے کر لیا کہ ترتیب بڑھتی ہوگی تب وہ طریقہ جس میں سے عدد کے اجزاء ضربی ہوں گے مفرد ہوگا حساب کے بنیادی مسئلے کے ریاضی اور دوسرے میدانوں میں بہت سے استعمال ہیں آئیے کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں۔

مثال 5: اعداد 4^n پر غور کیجئے جہاں n ایک طبعی عدد ہے، جانچ کیجئے کہ آیا n کی کوئی ایسی قدر ہے جن کے لئے 4^n کا اختتام صفر پر ہو۔

حل: اگر عدد 4^n کسی بھی n کے لیے ہندسہ صفر پر ختم ہوتا ہے تب یہ 5 سے تقسیم ہوگا یعنی 4^n مفرد اجزاء ضربی میں مفرد عدد 5 شامل ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ $(2)^{2n}$ اس لئے 4^n کا مفرد جزو ضربی 2 ہے۔ اس لئے حساب کے بنیادی مسئلے کی انفرادیت سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ 4^n کے مفرد اجزاء ضربی میں 2 کے علاوہ کوئی دوسرا مفرد عدد نہیں ہے۔ اس لئے ایسا کوئی بھی طبعی عدد n نہیں ہے جس کے لئے 4^n ہندسہ صفر پر ختم ہو۔

سابقہ کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حساب کے بنیادی مسئلے کو استعمال کر کے دو ثابت صحیح اعداد کا HCF اور LCM کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم اس مسئلے کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے۔ اس طریقہ کو ہم مفرد اجزاء ضربی کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے ایک مثال کے ذریعہ اس طریقہ کو دہراتے ہیں۔

مثال 6: مفرد اجزاء ضربی کے طریقہ سے 6 اور 20 کا LCM اور HCF معلوم کیجئے۔

$$\text{حل:} \text{ ہمارے پاس ہے } 20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5 \text{ اور } 6 = 2^1 \times 3^1$$

آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ $\text{HCF}(6, 20) = 2$ اور $\text{LCM}(6, 20) = 60$ ہے جیسا کہ آپ سابقہ کلاسوں میں کر چکے ہیں۔

نوٹ کیجئے کہ $\text{LCM}(6, 20) = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$ اعداد میں موجود ہر ایک مشترک مفرد اجزاء ضربی کی قیلی قوت کا حاصل ضرب۔

مذکورہ بالامثال سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ $(6,20) \times LCM(6,20) = HCF(6,20) \times LCM(a,b) = a \times b$ درحقیقت ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو مثبت صحیح اعداد a اور b کے لئے $HCF(a,b) \times LCM(a,b) = a \times b$ اس نتیجہ کے استعمال سے ہم دو مثبت صحیح اعداد کا LCM معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم دونوں ثابت اعداد کا HCF پہلے ہی معلوم کر چکے ہوں۔

مثال 7: مفرد اجزائے ضربی کے طریقہ سے 96 اور 404 کا HCF معلوم کیجئے اور پھر LCM بھی معلوم کیجئے۔

حل: 404 اور 96 کے مفرد اجزاء ضربی سے ہمیں ملتا ہے۔

$$96 = 2^5 \times 3, 404 = 2^2 \times 101$$

اس لئے ان دو صحیح اعداد کا $2^5 = 4 \text{ HCF}$ ہے

$$\text{LCM}(96, 404) = \frac{96 \times 404}{\text{HCF}(96, 404)} = \frac{96 \times 404}{4} = 9696 \text{ لیرى}$$

مثال 8: مفرد اجزائے ضربی کے طریقہ کو استعمال کر کے 6, 72, 120 کا HCF اور LCM معلوم کیجئے۔

حل: ہمارے پاس ہے۔

$$6 = 2 \times 3, 72 = 2^3 \times 3^2, 120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

یہاں 2¹ اور 3² مشترک اجزاءِ ضریبی 2 اور 3 کی با الترتیب اصغر (سب سے چھوٹی) تو تیس ہیں۔

$$\text{HCF}(6, 72, 120) = 2 \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

اور 5 مفرد اجزاءے ضریب، 13 اور 5 بالترتیب اعظم قوتیں ہیں جو تینوں اعداد میں شامل ہیں۔

$$\text{LCM}(6, 72, 120) = 2^3 \times 3^2 \times 5^1 = 360$$

ریمارک: نوٹ کچھ $16 \times 72 \times 120 \neq \text{HCF}(6, 72, 120) \times \text{LCM}(6, 72, 120)$. لئے تین اعداد کا حاصل

ضرب ان کے HCF اور LCM کے حاصل ضرب کے برابر نہیں ہے۔

مشن 1.2

11۔ مندرجہ ذیل ہر ایک عدد کو اس کے مفرد اجزاء ضربی کے حاصل ضرب کے طور پر لکھیے۔

- (i) 140 (ii) 156 (iii) 3825 (iv) 5005 (v) 7429

2۔ مندرجہ ذیل صحیح اعداد کے جوڑوں کا LCM اور HCF معلوم کیجئے اور تصدیق کروں کہ دونوں اعداد کا حاصل ضرب کے $LCM \times HCF =$

$$510 \text{ اور } 92 \quad 336 \text{ اور } 54 \quad 91 \text{ اور } 26 \quad (i) \quad (ii) \quad (iii)$$

3۔ مفرد اجزاء ضربی کے طریقہ کے استعمال سے مندرجہ ذیل صحیح اعداد کا LCM اور HCF معلوم کیجئے

$$25, 8 \text{ اور } 21 \quad 23, 17 \text{ اور } 29 \quad 15, 12 \text{ اور } 21 \quad (i) \quad (ii) \quad (iii)$$

4۔ $(306, 657)$ کا HCF دیا ہوا ہے 9 ان کا LCM $(306, 657)$ معلوم کیجئے۔

5۔ جانچ کیجئے آیا $\sqrt{6}$ کسی طبی عدد n کے لئے ہندسہ صفر پر ثتم ہوتا ہے۔

6۔ تشریح کیجئے کہ کیوں $13 \times 11 \times 7 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ اور $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 3$ 7 مرکب اعداد میں۔

7۔ کھیل کے ایک میدان کے چاروں طرف ایک دائیٰ راستہ ہے۔ سونیا میدان کا ایک چکر لگانے میں 18 منٹ لیتی ہے جبکہ روی ایک چکر 12 منٹ میں پورا کر لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ دونوں ایک مقام سے ایک ہی سمت میں ایک وقت چلانا شروع کرتے ہیں۔ کتنے منٹ بعد وہ دونوں ابتدائی مقام پر دوبارہ ملیں گے۔

1.4 غیر ناطق اعداد پر نظر ثانی

نویں کلاس میں آپ کو غیر ناطق اعداد اور ان کی خصوصیات سے متعارف کرایا گیا تھا۔ آپ نے ان کے وجود کے بارے میں مطالعہ کیا اور آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح دونوں ناطق اور غیر ناطق اعداد میں کوئی اعداد کی تشکیل کرتے ہیں۔ آپ نے غیر ناطق اعداد کو عددی خط پر پلات کرنا بھی سیکھا۔ لیکن ہم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ غیر ناطق ہیں۔ اس سیکشن میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ $\sqrt{5}, \sqrt{3}, \sqrt{2}$ اور عمومی طور پر \sqrt{p} غیر ناطق ہے جہاں p مفرد ہے۔ ایسے ثبوت میں ہم جس ایک مسئلہ کا استعمال کریں گے وہ ہے حساب کا بنیادی مسئلہ

یاد کیجئے کہ ایک عدد $\frac{p}{q}$, غیر ناطق اعداد کہلاتا ہے اگر اس کو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں نہ لکھا جاسکے جہاں p اور q صحیح اعداد ہیں اور

$q \neq 0$ ۔ غیر ناطق اعداد کی کچھ مثالیں جس سے آپ پہلے ہی واقف ہیں۔

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{15}, \pi, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, 0.10110111011110\dots$$

اس سے پہلے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ $\sqrt{2}$ غیر ناطق ہے۔ ہمیں ایک مسئلے کی ضرورت ہے جبکہ ثبوت کی بنیاد حساب کے بنیادی مسئلہ پر ہے۔

مسئلہ 1.3: مان لیجئے a ایک مفرد عدد ہے اگر p, q کو بھی تقسیم کرے گا، جہاں a ایک ثبت صحیح عدد ہے۔

* ثبوت: مان لیجئے a کے مفردا جزائے ضربی مندرجہ ذیل ہیں۔

جہاں $a = p_1 p_2 \dots p_n$ مفرد ہیں لیکن ضروری نہیں کہ مختلف ہوں۔

$$a = (p_1 p_2 \dots p_n) (p_1 p_2 \dots p_n) = p_1^2 p_2^2 \dots p_n^2$$

اب ہمیں دیا ہوا ہے کہ p, q کو تقسیم کرتا ہے۔ اس لئے حساب کے بنیادی مسئلے کی رو سے یہ پتہ چلتا ہے p^2 کے مفردا جزائے ضربی کا ایک جز ہے لیکن حساب کے بنیادی مسئلے کی انفرادیت کو استعمال کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ a^2 کے مفردا جزائے ضربی صرف $p_1 p_2 \dots p_n$ ہیں۔ اس لئے p, q میں سے ایک ہے اب کیونکہ a, p, q کو تقسیم کرتا ہے

اب ہم $\sqrt{2}$ کو غیر ناطق ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں

اس ثبوت کی بنیاد جس تکنیک پر ہے اسے تفاصیل کا ثبوت، کہتے ہیں (اس تکنیک کو ضمیمہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے)

مسئلہ 1.4: $\sqrt{2}$ غیر ناطق ہے۔

ثبوت: آئیے فرض کرتے ہیں کہ $\sqrt{2}$ ناطق ہے۔

اس لئے ہم صحیح اعداد r اور s (0 ≠ معلوم کر سکتے ہیں جبکہ $\frac{r}{s}$) میں

مان لیجئے r اور s میں ایک کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی ہے تب ہم اس مشترک جزو ضربی سے تقسیم کر کے حاصل کرتے ہیں۔

جہاں a اور b باہمی مفرد (Coprime) ہیں

$$as = b\sqrt{2}$$

* یہ امتحان کے نقطہ نظر سے نہیں ہے

دونوں طرف مریخ کرنے اور دوبارہ ترتیب دینے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $a^2 = 2b^2$ س لئے a^2 , b^2 کو تقسیم کرتا ہے۔
اب مسئلہ 1.3 کی رو سے یہ کہتے ہیں کہ a کو تقسیم کرتا ہے۔

اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں $a = 2c$ کسی صحیح عدد c کے لئے، a کی جگہ رکھنے پر ہمیں ملتا ہے $b^2 = 2c^2$ یعنی $2b^2 = 4c^2$
اس کا مطلب یہ b^2 کو بھی تقسیم کرتا ہے اس لئے b , c کو بھی تقسیم کرے گا (دوبارہ مسئلہ 1.3 کی رو سے جس میں $p = 2$
ہے) اس لئے a اور b میں 2 ایک مشترک جزو ضریب ہے۔

لیکن یہ تضاد ہے کیونکہ ہم نے مانا تھا کے a اور b میں 1 کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضریب نہیں ہے۔ اس تضاد سے ہمیں پتہ
چلتا ہے کہ ہم نے جو مانا تھا وہ غلط تھا یعنی کہ $\sqrt{2}$ ناطق ہے غلط ہے۔

اس لئے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ $\sqrt{2}$ غیر ناطق ہے

مثال 9: ثابت کیجئے $\sqrt{3}$ غیر ناطق ہے

حل: آئیے اس کے برخلاف فرض کرتے ہیں کہ $\sqrt{3}$ ناطق ہے

یعنی ہم ایسے صحیح اعداد a اور b ($\neq 0$) معلوم کر سکتے ہیں جن کے لئے

مان لیجئے a اور b میں 1 کے علاوہ ایک مشترک جزو ضریب ہے۔ تو ہم اس مشترک جزو ضریب سے تقسیم کر دیتے ہیں اور فرض
کرتے ہیں کہ a اور b ، ہم مفرد ہیں

$$b\sqrt{3} = a.$$

دونوں طرف مریخ کرنے اور ترتیب دینے پر ہمیں ملتا ہے $3b^2 = a^2$

اس لئے a^2 سے تقسیم ہو جائیگا اور مسئلہ 1.3 کی رو سے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ a بھی 3 سے تقسیم ہو جائیگا۔

اس لئے ہم $a = 3c$ لکھ سکتے ہیں جہاں c کوئی صحیح عدد ہے۔

کی جگہ رکھنے پر ہمیں ملتا ہے $3b^2 = 9c^2$ یعنی

اس کا مطلب ہے کہ b^2 بھی 3 سے تقسیم ہو جائے گا۔ اس لئے b بھی 3 سے تقسیم ہو جائیگا۔ (مسئلہ 1.3 کی رو سے جب $3 = p$)

اس لئے a اور b کم سے کم ایک مشترک جزو ضریب ہے۔

لیکن یہ اس حقیقت کی خلاف کرتا ہے کہ a اور b باہمی مفرد ہیں۔

اور یہ تضاد اس لئے ہوا کہ ہم نے غلط فرض کیا تھا کہ $\sqrt{5}$ غیر ناطق ہے۔

نویں کلاس میں ہم نے بیان کیا تھا

- کہ ایک ناطق اور غیر ناطق عدد کا حاصل جمع اور فرق غیر ناطق ہوتا ہے اور
 - ایک غیر صفر اور غیر ناطق عدد کا حاصل ضرب اور حاصل تقسیم غیر ناطق ہوتا ہے۔
- یہاں ہم کچھ مخصوص حالات کو ثابت کرتے ہیں۔

مثال 10: دکھائیے کہ $\sqrt{5}$ غیر ناطق ہے۔

حل: آئیے اس کے برخلاف فرض کرتے ہیں کہ $\sqrt{5}$ ناطق ہے

یعنی ہم دو باہم مفرد اعداد a اور b معلوم کر سکتے ہیں ($b \neq 0$) جن کے لئے $\sqrt{5} = \frac{a}{b}$

$$\text{لے } \sqrt{5} = \frac{a}{b} \text{ ہے اس مساوات کو دوبارہ ترتیب دینے پر ہمیں ملتا ہے}$$

$$\sqrt{5} = 5 \quad \frac{a}{b} = \frac{5b - a}{b}$$

کیونکہ a اور b صحیح اعداد ہیں اس لئے $\frac{a}{b}$ ناطق ہے۔ اور اس لئے $\sqrt{5}$ بھی ناطق ہے۔

لیکن یہ اس حقیقت کی نفی کرتا ہے کہ $\sqrt{5}$ غیر ناطق ہے۔

یہ تضاد اس لئے ہوا کیونکہ ہم نے غلط مانا تھا کہ $\sqrt{5}$ ناطق ہے۔

اس لئے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ $\sqrt{5}$ غیر ناطق ہے۔

مثال 11: دکھائیے کہ $\sqrt[3]{2}$ غیر ناطق ہے

حل: اس کے برخلاف ہم مانتے ہیں کہ $\sqrt[3]{2}$ ناطق ہے۔

یعنی ہم ایسے دو باہم مفرد اعداد a اور b ($b \neq 0$) معلوم کر سکتے ہیں جن کے لئے $\sqrt[3]{2} = \frac{a}{b}$

دوبارہ ترتیب دینے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $\sqrt[3]{2} = \frac{a}{b}$

کیونکہ $3, a$ اور b صحیح اعداد ہیں $\frac{a}{b}$ ناطق ہے اس لئے $\sqrt[3]{2}$ بھی ناطق ہو گا۔

لیکن یہ اس حقیقت کی نفی کرتا ہے کہ $\sqrt[3]{2}$ غیر ناطق ہے۔

اس لئے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ $\sqrt{2}$ غیر ناطق ہے۔

مشق 1.3

- 1۔ ثابت کیجئے $\sqrt{5}$ غیر ناطق ہے۔
- 2۔ ثابت کیجئے کہ $\sqrt[3]{2}$ غیر ناطق ہے۔
- 3۔ مندرجہ ذیل کو غیر ناطق ثابت کیجئے۔

(i) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(ii) $\sqrt{5}\sqrt{5}$

(iii) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

1.5 ناطق اعداد اور ان کے عشری اظہار پر نظر ثانی

نویں کلاس میں آپ نے پڑھا ہے کہ ناطق اعداد کا عشری پھیلاو یا تو مختتم ہے یا غیر مختتم تکراری ہے اس سیکشن میں ہم ایک ناطق عدد $\frac{P}{Q}$ پر یہ جاننے کے لئے غور کریں گے کہ $\frac{P}{Q}$ کا عشری پھیلاو مختتم اور کب غیر مختتم اور تکراری ہے۔ ایسا ہم بہت سی مثالیں لے کر کرتے ہیں ایسے مندرجہ ذیل اعداد پر غور کرتے ہیں۔

- (i) 0.375 (ii) 0.104 (iii) 0.0875 (iv) 23.3408.

(i) $0.\overline{375} = \frac{375}{1000} = \frac{375}{10^3}$

(ii) $0.\overline{104} = \frac{104}{1000} = \frac{104}{10^3}$

اب

(iii) $0.\overline{0875} = \frac{875}{10000} = \frac{875}{10^4}$

(iv) $23.\overline{3408} = \frac{233408}{10000} = \frac{233408}{10^4}$

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام اعداد پر ناطق اعداد میں ظاہر کئے جاسکتے ہیں جس کا نسب نما 10 کی کوئی قوت ہے اسے ہم شمارکنندہ اور نسب نما کے درمیان تمام مشترک اجزاء ضربی کو کینسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔

(i) $0.\overline{375} = \frac{375}{10^3} = \frac{375}{5^3} = \frac{3}{2^3}$

(ii) $0.\overline{104} = \frac{104}{10^3} = \frac{104}{2^3 \times 5^3} = \frac{13}{5^3}$

$$(iii) \frac{875}{1000} = \frac{875}{10^3} = \frac{7}{8}$$

$$(iv) \frac{233408}{1440} = \frac{233408}{144 \times 10} = \frac{233408}{144} \times \frac{1}{10} = \frac{161}{10} = 16.1$$

کیا آپ کوئی نمونہ (پیرن) دیکھ رہے ہیں جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے ایک حقیقی عدد کو جس کا عشری پھیلاؤ کو ایک ناطق عدد $\frac{p}{q}$ جہاں p اور q باہم مفرد ہیں۔ پختتم اور نسب نما (یعنی q) کے مفرد اجزاء ضربی صرف 2 اور 5 یا دونوں کی قوتیں ہیں، اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ ایسا ہی ہو گا کیونکہ 10 کی قوتیں کے صرف 2 اور 5 ہی اجزاء ضربی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے چند ہی مثالیں لی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی حقیقی عدد کو جس کا عشری پھیلاؤ مختتم ہے ایک ایسے ناطق عدد میں ظاہر کر سکتے ہیں جس کے نسب نما کی قوت 10 ہو۔ مزید 10 کے واحد مفرد اجزاء ضربی 2 اور 5 ہیں۔ اس طرح سے شمارکنندہ اور نسب نما کے درمیانی یا مشترک اجزاء ضربی کو کینسل کر کے ہم پاتے ہیں کہ ناطق عدد $\frac{p}{q}$ کی شکل کا ہوگا جہاں q کے مفرد اجزاء ضربی $2^m 5^n$ کی شکل کے ہوں گے جہاں m اور n غیر منفی صحیح اعداد ہیں آئیے اپنے نتیجہ کو سی طور پر لکھتے ہیں

مسئلہ 1.5: مان لیجئے x ایک ناطق عدد ہے جس کا عشری پھیلاؤ مختتم ہے۔ تب x کو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں p اور q باہم مفرد ہیں اور q کے مفرد اجزاء ضربی $2^m 5^n$ کی شکل کرے ہیں تو q کے مفرد اجزاء ضربی $2^m 5^n$ کے میں اکراں کے معکوس پر غور کریں تو کیا ہو گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ 1.5 میں اکراں کے معکوس پر غور کریں تو کیا ہو گا۔

یعنی اگر ہمارے پاس $\frac{p}{q}$ کی شکل کا ایک ناطق عدد ایسا ہے جس میں q کے مفرد اجزاء ضربی $2^m 5^n$ کی شکل کے ہیں جہاں m اور n غیر منفی صحیح اعداد ہیں تو کیا $\frac{p}{q}$ کا عشری پھیلاؤ مختتم ہے؟

آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی واضح وجہ ہے اس کو صحیح سمجھنے کی، آپ اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ $\frac{p}{q}$ کی شکل کے کسی بھی ناطق عدد جہاں $b, 10^m$ کی کوئی قوت ہے، کا عشری پھیلاؤ مختتم ہو گا۔

اس لئے یہ ایک داشمند انہ قدم ہو گا کہ $\frac{p}{q}$ کی شکل کے ایک ناطق عدد، جہاں $q = 2^m 5^n$ کی شکل کا ہے کو ایک تبادل ناطق عدد ہے $\frac{p}{q}$ کی شکل میں تبدیل کر دیں جہاں $b, 10^m$ کی ایک قوت ہو۔ آئیے ہم مندرجہ بالامثالوں کی طرف واپس چلتے ہیں عمل کو پچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔

$$(i) \frac{3}{8} = \frac{3}{2^3} = \frac{3 \times 5^3}{2^3 \times 5^3} = \frac{375}{10^3} = 0.375$$

$$(ii) \frac{13}{125} = \frac{13}{5^3} = \frac{13 \times 2^3}{2^3 \times 5^3} = \frac{104}{10^3} = 0.104$$

$$(iii) \frac{7}{80} = \frac{7}{2^4 \times 5} = \frac{7 \times 5^3}{2^4 \times 5^3} = \frac{875}{10^4} = 0.0875$$

$$(iv) \frac{14288}{625} = \frac{2^9 \times 7 \times 521}{5^4} = \frac{2^9 \times 7 \times 521}{2^4 \times 5^4} = \frac{513408}{10^4} = 51.3408$$

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم $\frac{p}{q}$ کی شکل والے کسی بھی ناطق عدد کو جہاں $q = 2^n 5^m$ کی شکل کا ہے $\frac{a}{b}$

کے معادل ناطق عدد میں تبدیل کر سکتے ہیں جہاں 10 کی کوئی قوت ہے۔ اس لئے ایسے ناطق اعداد کا عشری پھیلاو مختتم ہوتا ہے۔ اسے اپنے نتیجہ کو سی طور پر لکھتے ہیں۔

مسئلہ 1.6: مان لیجئے $\frac{p}{q}$ ایک ناطق عدد ہے۔ تب اس طرح کہ q کی منفرد اجزاء ضریب $2^n 5^m$ کی شکل کرے ہوں گے۔ n کا عشری پھیلاو بھی مختتم ہو گا اب ہم ایسے ناطق

اعداد کے بارے میں جاننے کرے تیار ہیں جن کا عشری پھیلاو غیر مختتم اور تکراری ہے۔ ایک بار پھر ہم ایک مثال پر غور کرتے ہیں جو آپ کے نویں جماعت کی نصابی کتاب کے باب 1 کی مثال 5 ہے۔ یعنی $\frac{1}{7}$ یہاں باقی 1, 5, 4, 6, 2, 3, 1, 5, 4, 6, 2, 3 اور مقسوم علیہ 7

نوٹ کیجئے کہ یہاں نسب نما، صاف ظاہر ہے $2^n 5^m$ کی شکل کا نہیں ہے۔ اس لئے

مسئلہ 1.5 اور 1.6 کی رو سے $\frac{1}{7}$ کا عشری پھیلاو مختتم نہیں ہو گا۔ یعنی صفر کبھی بھی باقی کے طور پر نہیں آئے گا۔ (کیوں؟) اور باقی خاص مرتبہ کے بعد اپنے آپ کو دہرانے لگے گا۔ اس لئے ہمیں $\frac{1}{7}$ کے خارج قسمت میں ہندسوں کا ایک بلاک، جو 142857 ہے ملے گا جس کی تکرار ہوتی رہے گی۔

جو ہم نے $\frac{1}{7}$ کے مسئلہ میں دیکھا وہ تمام ایسے ناطق اعداد کے لئے درست ہے جو مسئلہ

1.5 اور 1.6 میں نہیں شامل کئے گئے ہیں۔ ایسے اعداد کے لئے ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے۔

مسئلہ 1.7: مان بیجتے $\frac{p}{q}$ ایک ناطق عدد ہے جس میں q کے مفرد اجزاء کے ضربی $2^{n}5^m$ کی شکل کے نہیں ہیں، جہاں n اور m غیر منفی صحیح اعداد ہیں تب n کا عشری پھیلاو غیر مختتم اور تکراری ہوگا۔
ذکورہ بالامطالعہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کسی بھی ناطق عدد کا عشری پھیلاو یا تو مختتم ہو گا یا غیر مختتم تکراری۔

مشق 1.4

1۔ لمبی تقسیم کیے بغیر بیان کیجئے کہ مندرجہ ذیل ناطق اعداد کا عشری پھیلاو مختتم ہے یا غیر مختتم تکراری۔

- (i) $\frac{13}{3125}$
- (ii) $\frac{17}{8}$
- (iii) $\frac{64}{455}$
- (iv) $\frac{15}{1600}$
- (v) $\frac{29}{343}$
- (vi) $\frac{23}{2^3 5^2}$
- (vii) $\frac{129}{2^2 5^2 7^4}$
- (viii) $\frac{6}{15}$
- (ix) $\frac{35}{50}$
- (x) $\frac{77}{210}$

2۔ ذکورہ بالاسوال نمبر 1 میں دیئے گئے ان تمام ناطق اعداد کا عشری پھیلاو معلوم کیجئے جن کا عشری پھیلاو مختتم ہے۔

3۔ مندرجہ ذیل حقیقی اعداد کا عشری پھیلاو نیچے دیا گیا ہے۔ ہر سوال میں بنائیے کہ وہ ناطق ہیں یا نہیں اگر وہ کی
شکل کے ناطق اعداد ہیں تو آپ q کے مفرد اجزاء کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔

- (i) $43.\overline{123456789}$
- (ii) 0.120120012000120000
- (iii) $43.\overline{123456789}$

خلاصہ 1.6

اس باب میں آپ نے مندرجہ ذیل نقاط کا مطالعہ کیا۔

1۔ اقلیدس کا تقسیم کا معاونہ و ثبت صحیح اعداد a اور b کے لئے ایسے دکمل اعداد q اور r کا موجود ہوتے ہیں جو $a = bq$
 $0 \leq r < b$ ، $+v$ کو مطمئن کرتے ہیں

2۔ اقلیدس کی تقسیم کا الگوریتم: اس کی بنیاد اقلیدس کے تقسیم کے معاونہ پر ہے اس کے مطابق وثابت صحیح اعداد a اور b ،
جہاں b کا HCF a کا ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

قدم 1: q اور r معلوم کرنے کے لئے تقسیم کے معاونہ کا اطلاق کیجئے جہاں $a = bq + r$ ، $0 \leq r < b$.

قدم 2: اگر $r = 0$ تو b اور $r \neq b$ تو a پر اقلیدس کے معاونہ کا استعمال کیجئے۔

قدم 3: اس عمل کو جب تک جاری رکھئے جب تک کے باقی صفر ہو جائے اس مرحلہ پر مقسم علیہ $\text{HCF}(a,b)$ ہوگا

$$\text{اور } -\text{HCF}(a,b) = \text{HCF}(b, r)$$

3۔ حساب کا بنیادی مسئلہ:

ہر مرکب عدد کو مفرد اعداد کے حاصل ضرب کے طور پر ظاہر (اجزائے ضربی میں تخلیل کر سکتے ہیں، اجزائے ضربی کی تخلیل منفرد ہے بھلے ہی اجزائے ضربی کی ترتیب مختلف ہو۔

4۔ اگر p مفرد ہے اور p^2 کو تقسیم کرتا ہے تو a, p کو بھی تقسیم کرے گا جہاں a ایک ثابت صحیح عدد ہے۔

5۔ ثابت کیجئے کہ $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ غیر ناطق ہیں۔

6۔ مان لیجئے x ایک ایسا ناطق عدد ہے جس کا عشری پھیلا و مختتم ہے۔ تو ہم کو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں جہاں p اور q مفرد ہیں اور q کے مفرد اجزائے ضربی $2^n 5^m$ کی شکل میں ہیں اور n غیر منفی صحیح اعداد ہیں۔

7۔ مان لیجئے $\frac{p}{q} - x$ ایک ناطق عدد ہے جبکہ q کے مفرد اجزائے ضربی $2^n 5^m$ کی شکل میں ہیں جہاں m اور n غیر منفی صحیح اعداد ہیں، تو x کا عشری پھیلا و مختتم ہے۔

8۔ مان لیجئے $\frac{p}{q} - x$ ایک ناطق عدد ہے، جبکہ q کے مفرد اجزائے ضربی $2^n 5^m$ کی شکل میں نہیں ہیں جہاں m اور n غیر منفی صحیح اعداد ہیں تو x کا عشری پھیلا و غیر مختتم اور نکراری ہو گا۔

قارئین کے لیے نوٹ

آپ دیکھے ہیں کہ $\text{HCF}(p, q, r) \times \text{LCM}(p, q, r) \neq p \times q \times r$ جہاں p, q, r ثابت صحیح اعداد ہیں (مثال 8 دیکھیے) جبکہ تین اعداد p, q, r کے لئے مندرجہ ذیل نتیجہ درست ہے۔

$$\text{LCM}(p, q, r) = \frac{p \times q \times r \times \text{HCF}(p, q, r)}{\text{HCF}(p, q) \times \text{HCF}(q, r) \times \text{HCF}(p, r)}$$

$$\text{HCF}(p, q, r) = \frac{p \times q \times r \times \text{LCM}(p, q, r)}{\text{LCM}(p, q, r) \times \text{LCM}(q, r) \times \text{LCM}(p, r)}$$